

## Übungen zur Theoretischen Physik 2 für das Lehramt L3 – Blatt 10

---

### Aufgabe 1 [10 Punkte]: Faltungssatz für Fourier-Transformationen

Wir betrachten die Fourier-Transformation und ihre Umkehrung für zeitabhängige Funktionen, die durch

$$\begin{aligned}\tilde{f}(\omega) &= \int_{\mathbb{R}} dt f(t) \exp(i\omega t), \\ f(t) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) \exp(-i\omega t)\end{aligned}\quad (1)$$

gegeben sind.

Die Faltung zweier Funktionen  $f$  und  $g$  im Zeitbereich ist durch

$$h(t) = f * g(t) = \int_{\mathbb{R}} dt' f(t-t')g(t') \quad (2)$$

definiert. Zeigen Sie, dass für die Fourier-Transformierten dieser Funktionen

$$\tilde{h}(\omega) = \widetilde{f * g}(\omega) = \tilde{f}(\omega)\tilde{g}(\omega) \quad (3)$$

gilt.

**Tip:** Bei der Rechnung ist die Formel

$$\int_{\mathbb{R}} dt \exp(-i\omega t) = 2\pi\delta(\omega) \quad (4)$$

nützlich.

---

### Aufgabe 2 [10 Punkte]: Fourier-Darstellung elektromagnetischer Wellen

Es seien die Ladungs- und Stromverteilung durch ihre Fourier-Darstellung bzgl. der Zeit

$$\begin{aligned}\rho(t, \vec{x}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{\rho}(\omega, \vec{x}) \exp(-i\omega t), \\ \vec{j}(t, \vec{x}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \vec{\tilde{j}}(\omega, \vec{x}) \exp(-i\omega t),\end{aligned}\quad (5)$$

gegeben.

(a) [2 Punkte] Berechnen Sie die Fourier-Transformierte

$$\tilde{D}_{\text{ret}}(\omega, \vec{x}) = \int_{\mathbb{R}} dt D_{\text{ret}}(t, \vec{x}) \exp(i\omega t) \quad (6)$$

der retardierten Green-Funktion

$$D_{\text{ret}}(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi r} \delta\left(t - \frac{r}{c}\right) \quad \text{mit} \quad r = |\vec{x}| \quad (7)$$

des D'Alembert-Operators und interpretieren Sie das Resultat physikalisch.

- (b) [4 Punkte] Bestimmen Sie mit Hilfe des Faltungssatzes aus der vorigen Aufgabe die Fourier-Transformierten der retardierten Lösungen der Maxwell-Gleichungen für die Potentiale in Lorenz-Eichung

$$\begin{aligned}\Phi(t, \vec{x}) &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}} dt' \int_{\mathbb{R}^3} d^3x' D_{\text{ret}}(t-t', \vec{x}-\vec{x}') \rho(t', \vec{x}'), \\ \vec{A}(t, \vec{x}) &= \mu_0 \int_{\mathbb{R}} dt' \int_{\mathbb{R}^3} d^3x' D_{\text{ret}}(t-t', \vec{x}-\vec{x}') \vec{j}(t', \vec{x}')\end{aligned}\quad (8)$$

Wir nehmen dabei an, dass die Ladungen und Ströme für  $|\vec{x}| = r > R$ , also außerhalb einer Kugel vom Radius  $R$  um den Ursprung verschwinden. Geben Sie die einfachste Näherung für das „Fernfeld“ bei  $r \gg R$  an.

- (c) [4 Punkte] Berechnen Sie die Fourier-Transformierten der Felder, die wegen  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi - \partial_t \vec{A}$  und  $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$  durch

$$\tilde{\vec{E}}(\omega, \vec{x}) = -\vec{\nabla} \tilde{\Phi}(\omega, \vec{x}) + i\omega \vec{A}(\omega, \vec{x}), \quad \tilde{\vec{B}}(\omega, \vec{x}) = \vec{\nabla} \times \vec{A}(\omega, \vec{x}) \quad (9)$$

gegeben sind.

Behalten Sie auch hier wieder nur die führende Ordnung  $\mathcal{O}(1/r)$  in Potenzen von  $1/r$  („Fernfelder“) bei.